

**OSTEOSIS
DEXTERI LOBI
JECURIS
SINGULARIS
CASUS...**

Pietro Bruni



OSTEOSIS
DEXTERI LOBI JECURIS

SINGULARIS CASUS

Dissertatio Inauguralis

QUAM

AD MEDICINÆ LAUREAM

IN LYCEO MAGNO PATAVINO

RITE ADQUISITAM

PROMISSIT

PETRUS BRUNI

TANTURUS & CORRIOLARI



PATAVII

EX OFFICINA SCIENTIARUM TITULO MINTITA

1818



Handwritten signature or note.



OSTEOSIS

DEXTERI LOBI JECURIS

ROSELLAE CARL

PROOEMIUM

Tantas mihi in die laetitiae, vitae meae juvenilitatis, illa die quae meorum gratia praecceptorum Laureae Medicinae mihi per illustre decus confertur, quidam in caligine ingruat vel quod munifici honoris non sit imper, aut debet, aut possum exhibere?

Haec modo instructus lumbis, quae doctrinae mihi tradita maneat, quam affande perspicacissimo curam intellecta, semitam minus sedum percurrere malui, phaenomeni anatomiae, pathologiae compendium curando historiam; quod longe profecto meditatione praetermodum singulare deprehendi, atque praecleariorum artis nostrae culturam attentione perdissum existimavi. Agitur enim de ossificatione totius superficiei dexteri lobi hepatis, mole naturalem coequentis, fere sphaeroidalis forma, interna cum cavitate materie pulsatice flavescens repleta, notabil sine tam lobi sinistri cum cystis felleae leniore.

Extraordinaria phaenomeni singularitas et peculiaris circumstantiae singulae innotescerent postularet, atque id eo magis cum nostris temporibus anatomicis, pathologiae studium undique diffunditur, et scientiae partem debili nimis obsoletam constituit. At paucus in notis hujusmodi cognitionem esse agendam dolendum quidem, neque generalis observatione limites tam quoad historicam rei formam, cum quoad partes, vel ut proprius dicam cum Andral, specialia et elementa anatomica transgredi possit, quas plus minusve morbosae visceris alterationi participarent. Quareis enim omnem adhiberem diligentiam, generales tantum, et haec paucas notiones colligere debuit mihi fuit; quae insuper illa destituerent indicia quae relato ad statum morbosum viscerum pectoris, caeterorumque abdominalis requiruntur; quare utroque illa sint regula et maturitate fuerit instituta, partesque confusae et deformatae essent, quando inventam de repente pathologicam exemplar, quod praepere lato servari, me ad cadaver perspicendum iudavit.

Quocumque sit modo etiam imperfecta nimis phaenomeni *expositio*, quam mihi proponi iudicaretur, spero nihilominus voluntatem meam fore, ut aequi bonique lectores faciant, atque phaenomeni cognitio non despicitur, quod nunc quoque gravis momenti ad solutionem petitiorem questionum pathologi-

carum fieri potest, illius praesentem quam promissil
celeberrimus Kröysig:

« Num tales non in theoria vitae progressus fece-
-rimus, ut illam eo impellere valeamus, unde nobis
« ideam claram et distinctam processionis alteratio-
« nis morbosarum, hactenus in organismo contin-
« guam, comparare possimus? »

Historia.

Etd, decante Botcharoff, infirmitatibus valitudi-
nis hepar pene ceteris organis sit obnoxium, et cau-
tem plurimorum morborum chronicorum sicut, re-
stinuam observandi habemus opportunitatem obser-
vati et conspici in studio anatomiae pathologicae
hujusce visceris sicut progressus; constituendum tamen
est specialium phenomenorum significationem, pe-
culiarumque formarum hepar stimentium morbos
affectum diagnosis ambiguis et obscuritate ad hanc
precare.

Atque ad hujus sententiae veritatem magis magi-
sque confirmandam argumentum erui potest ab ex-
gais imperfectisque notis morbi hepatici a quodam
Antonio Faltra villico ex pago Conglomerati per-
lati; que in individuo observationis phenomenorum
contigit, quem pro dissertationis Inauguralis thes-
is publici faciendam jura mihi proposui.

Rusticus praefatus robusta corporis compage, formae regulari, persona modice elata, habita in angustum altitudo praeditus, postrema quoque in annis gravis nutritio laudabili, miserrime in aëre conditioe corporis rei penuriam perspectus est, improbia neque laboribus pepercit. Utrum inuente estate aegrotaverit ignoramus; a juventute doloribus ventris per hypochondria praesentibus raptantibus laboribus solummodo constat.

Annon aëris rigorem quintum usorem dedit, nullo sine molestia, morbo, memoratis exceptis doloribus, vitare egit, qui intervalla quidem indeterminata, nulloque cum erroribus dieteticis orau, molestiam quandam semper ipsi tolerant.

Aetate ejus aëre trigésimo quinto, quoniam nos habet modo, graviter aegrotavit; plures vixit sectiones faisse institutas, et molestias jam indicatas minus inde longa morbum serie frequentes faisse totum scimus. In posterum autem habitaculum eorum cursum iterum suscepant, sanorumque processu dirigeret factus eo incrementum, ut accessus, fortasseque austerum collicorum biliarium accumarent: quae rustica sub laboribus praesentim, vel extraordinaria atmosphaerica vicissitudine, frigido-humida, aut pluviosa praecipue, superueniente, individuum nostrum aggredebantur.

Anno quadragésimo sexto denuo advenit valutu-

ditae corruptae est; est nihil hauriens nisi primas vic-
tiae ad lustrar iteratarum ope sanguinis depletionem
pristinam sanitatem recuperavisse, minus eundem pari-
ter a doloribus fuisse rotatum, qui apparentis eorum
acutici ab hinc usque characterem oculis amiserunt.
Prima tum vice incommodam quandam molestiam
peculiarem ad regionem hypochondrii dexteri ani-
madvertit, aliquae enim aequae ponderis sub respira-
tione data violentiae in motibus, et aliqua aedematia
ad pedes indicia comparatione observavit; nihilomi-
nus paucos iterum annos rusticis laboribus operam
impendere, ceterisque fatigantibus negotiis conti-
nuavit.

In morbum tandem coejectus, factoque anster-
natus citricum nesecondum Congelatione die trige-
sima Martii anno 1833, aetate autem erat annos
quinquagesimo septimo, petere coactus est. Habitus
ejus extensus miserandam in modum videtur affec-
tatur: artus inferiores quam plurimum tumidi, ven-
ter adpectus acutissimus; facies leucophlegmatica; cutis
flaccida; respiratio gravis, difficilis in lateribus de-
cubitus; eo magis paries abdominalis hypochondrio
dextero respondens elevatus, qui aliquem extra ulti-
marum costarum marginem, per tractum ducum atque
cristae adparebat; alia medica, lingua humida-pal-
lida; adpectus cutis troctas; faeces materiae sufficien-
ter elaboratae, duriores, colorisquo cinerei; urinae

peroso et limpidae. Quam ille in Xenodochio virtuti remediorum indolis adstantia, et asperientia, videlicet propeptatorum Rhei, Aloë, alicujus mercurialis, ter-
 mino foliatas tartari, quo dantibus elevatis adhibita est; submittitur seger noster; promptam adeo et mo-
 mentosam levamen recepit, ut subito, copioseque urinarum fluxu cuncti fere externae tumefactionis libe-
 ratus, et respirazione minus imperfecta restituta, die
 quadragesima septima ab ejus in hospitium ingressu,
 venia sibi abeundi concessa, die decima tertia Maij
 1834 suorum amplexuum adiit. Quorum ope molli-
 rum cum convalescenti, aut saltem leviora mala ejus
 evanescerent per quod progressus adfectionis evidenter
 hepaticae substantiae paterentur distansum tempus.
 Denique autem graviter correptus, et ad extremam
 diutius adductus propter eandem mortis for-
 mam ob quam antea ad Neocomiam se receperat,
 hac die vigesima quarta Decembris 1834 mi-
 nus est, liadem ac alia pharmacia et therapia cu-
 rata est, eandem pariter effectum consequentes, ut
 ab hospitio sponte egrediretur die vigesima octava
 Februarii 1835, ab ejus receptione autem sexagesi-
 ma aetate.

Vitam adhuc protraxit ulla sine digestionis notabili
 perturbatione, appetitu imo erecto, de sensu ponderis
 vel doloris gravitatis, molesti ut plerumque distensio-
 nis inferioris et juxta marginem ultimarum costarum

orationi consociata, inspirationem celeri sub motu praespedita eorum consequens.

Mense Augusto anni ejusdem quem virum extrema praestantia laboraret, atque iterum in sanarium esse incisurus, ter ad Neocooniam confugit, ut auxilium haberet, statuit, ibique admissa omnia rationem et aliam thesperis obtulit. Minoris efficaciam remedia alia in usum vocata, et utilia experimenta comprobata esserant; infusiones verum leucorum Jussiperi cum tinctura martis tartarizata, una cum terra foliata tartari folium adto symbolum extulerunt, ut imminuta ter cellulari tate fere inhibitions, recuperatis viribus, quibus potitus erat destitutus, septuaginta duas post disturnas moras dies, a Neocoonia die septima Novembria 1835, iterum potuit dimitti.

Duco post moram ex quibus ad eum redierat, in morbum iterum iterumque graviter reliquum est. Ut Xanthodochium iterum petere hortatus est, ipse autem recusavit; ingravescantibus miculantibusque interea symptomatibus morbi, curam inopem orthopneum fere suffocante, evasit, atque die decima Martii 1836, transiit. — Sed brevis fuit mora: dies enim quarta ab ejus ingressu vitas vix necessaria fuit, lethalis orthopneum insulso correptas die decima quinta Martii, aestate anno septuagesimo occubuit.

Necropsia.

Hepar quod sumus descripturi, aperto cadavere, naturalem occupabat situm, ponderis canis inferioris aliquantisper trabebatur, ligamentis elongatis. Lobi dexteri volumen pro tertia parte normale excedebat; figura ovalis, diameter verticalis major, margines obtusi, facies anterior valde convexa, et convexa pariter est posterior; hujusce lobi latus versus dexteram ambas facies magis invicem accedunt ita, ut partium harum utroqueque minorem convexitate gradum ostendit. Lobus sinister normalis, ille Spigelii illosus, ceteri lobi disparuerunt, Cystis fellea seorsum adhaeret regioni; ligamenta juxta naturae normas hepar sustinebant. — Viscere propius examinato lobus dexter osseam praeferebat densitatem, eandem percussus sonum mittebat, ac si cavitatem capere aliqua repletum materiam indigitaret; substantiae hepaticae quasi lingua, hujus cuius organi speciem exhibet, lobi sinistri, ut ita dicam, continuatione producta, basi ipsa amborum majorum loborum conjunctionis tractum circumstantibus, super latum dexterum, margine suo superiore lineam leviter curvam describendo, extenditur, et apice ovalis super praefati inferiorum extremitatem attingit; hujusce linguae margo inferior lineam fere rectam percurrit, ut cystis fellea quae lobo etiam adfecto adhaeret, insertionem obliquis lin-

juxta linguam spléndido ad huc est quinqué linearum, et secundo semineque attenuatur ita ut rursus eadem fargiat; maxima ejus latitudo quatuor attingit pollices, quatuor longitudo; apex acutissimus est, hujus spinulosissimam aliam substantiá illi lobi dexteri identicam invenitur. In superficie lobi dexteri membranae paritoscella ab hepate suppeditata conspicitur, sub qua altera hepatica propria, comparat, quas peristitii mœuere illi viscera parti rursus qualificatas tangitur, solida, parvisque prominentia, et levibus depressionibus undique diffusa aspera. Fecies posterior ejusdem lobi propter suam relate ad formam perroniceam, non omnes quas in hepate normali partes observantur, exhibet; et cum viscus male a cadavere fuerit oblatus, vasque ejus prope substantia, quia vasa ipsorum statim rursus adverteat saluati resili; diuque tantum veras portarum distinguitur infra lobum Spigelii incipiens, lobum dexterum et sinistram partibus lumbis viscerum partes animis hujus visceris partium, et illis lobi dexteri propter suam substantiam productam interceptis. Lobum inter dexterum et Spigelianum diu adest vena cava, cui classe sunt foramina ramorum a lobo dextero procedentium; namque tertiam lineam partem in latere huius lobi respondente emittens, circumferentie pollicis tantum notatur, quam rami alioque in hanc diuam eductis foramen saluati arbitramur; hoc autem spatium te-

ovis membrana alba octupet. Nullam cystis fol-
 lula lacinarum satula, hile capdebatur aut dilataio,
 colorique viridis pallioecutia. Lobi dexteri periphe-
 ria iusta diametri verticalis mens pollicem decem et
 septem, ceto insuper lineas habet; illa verum hori-
 zontalis quindacim est. Serrae ope mediana in parte
 lobi dextero sensu ventriculi diviso, capsulam totam
 substantiam quandam rae in capitate conspicuam il-
 lam rae coriacea facti sumus. Ovis sphaeroides non
 undique aequalis est, minor facie anteriori respu-
 dens, major posterior; subtiliora sphaeroidia pun-
 ctum dorsum linearum, quatuor majora sunt; consi-
 stentias pariter gradus diversas; daries posteriores ac
 anteriores ubi ac duabus efformatum lacinia validiori
 praefiori cedentibus adparet. Cavitate diameter ab una
 ad alterum ovoidalium extremitatum sex pollicibus,
 lineisque ceto; ab uno ad alterum laterum sex pol-
 licibus, lineisque duabus; punctum majoris distansie
 ab uno ad alterum faciem tribus pollicibus lineisque
 ceto cecutere evicemus. Tota castis materia pulchra,
 densitatem substantiae cerebelle sustulente, flavo-
 tritum replebatur; non ulla membrarum in sono-
 tipas complicatarum, duabus, tribus lacinia con-
 stitutarum frustra tam exteriorum cum interiorum hinc il-
 lis irregulariter diffundebatur; esse vero quae primo
 intuitu cylindri speciem offerebant, nomini illorum
 membrarum plicet acundem substantiam pulsatam

continentes esse dignoscitur; quae substantia alveolaris causa in quo liquor servatur cassiam consistens esse conspicitur. Cavum cunctae superficiei externae ad iunctur scabrae substantia haesit ac prima characteribus, sola enim consistenti a varia erit, quod aut cassiam, praesente abducebatur. Nonnullae insuper lineae illius maculae profundae omni adherentes, reticulari duplici lentis peripheria praeditae, coloris rubro-croci, frequentiores in lateri lobo sinistro respondente conspiciuntur.

Analysis Chemica.

Substantia cavae cassiam occupans haec constat principia ostendit, nempe: resina biliori pro maxima parte, picrocella, materia flavo peculiari, phosphate sodae, indolis chlorureti sodii, indicia sulphatis calcis, et oxydi ferri. Parietes cavae haec patent elementa, observandum autem in his phosphatum calcis magis abundare.



THESES DEFENDENDÆ

1. Ante maturitatem cataractae operatio non est facienda.
2. Pulsus parvus rursus sectionem non semper totat.
3. Rachitis et scrofula ejusdem morbi formae diversae sunt.
4. Emetica non modo evacuationem promouent, sed etiam valide in nervos agunt.
5. Febris gastricae aut biliosae morbi non sunt simplices, sed morbi essentialiter compositi.
6. Methodus nutritiva omni in phthisi pulmonari non juvat.
7. Phthisis pulmonaris curatio utilis non desperanda.
8. Regimine diætetico exanthemata acuta, chronica medicamentis curantur.
9. Angina in scarlatina epidemica est symptoma essentialis, et morbi characteristicum.

10. Morbus mortis est principium.

11. Non omnes morbi sunt omnino insanabiles.

12. Venæ sectio in febribus gastricis aut biliosis acutis, minus indicata est quam in phlogisticis communibus catharralibus rheumaticis acutis.

